

Kombinační léčba hypertenze ve světle studií STAR a STAR-LET str. 12

- 1) Fixní kombinace trandolapril/verapamil SR ve srovnání s kombinací losartan/hydrochlorothiazid
 - a. **významně snížila hladinu glykémie ve 2.hodině OGTT**
 - b. neměla významnější vliv na hladinu glykémie
 - c. lehce zvýšila hladinu glykémie ve 2. hodině OGTT

Současná léčba anginy pectoris (AP) v ČR str. 14

- 2) Nejčastější manifestací ICHS je
 - a. nestabilní angina pectoris
 - b. infarkt myokardu
 - c. **námahová angina pectoris**
- 3) Z antianginózních léků byly nejčastěji předepisovány
 - a. nitráty
 - b. molsidomin
 - c. **betablokátory**
- 4) Podle průzkumu studie ATP III jsou u nás z nitrátů nejčastěji předepisovány
 - a. **isosorbid mononitrát (ISMN)**
 - b. isosorbid dinitrát (ISDN)
 - c. glycerol trinitrát
- 5) Přidání trimetazidinu do kombinované léčby AP
 - a. **přineslo snížení výskytu anginózní bolesti při námaze i v klidu**
 - b. přineslo pouze snížení výskytu anginózní bolesti v klidu
 - c. **přineslo snížení dušnosti**

Projekt MOET DM str 16

- 6) Česká republika se při hodnocení kvality péče o diabetiky v rámci Euro Diabetes Consumer Index z 29 zemí umístila na:
 - a. 1.místě
 - b. 15. místě
 - c. **23. místě**
- 7) V rámci studie MOET jsou dosavadní výsledky praktických lékařů ve srovnání s výsledky diabetologů
 - a. lepší
 - b. **zcela srovnatelné**
 - c. horší

Pandemická chřipka

– praktické aspekty očkování str. 22

- 8) Očkování proti pandemické chřipce a proti sezónní chřipce
 - a. **lze provést v jeden den do obou ramen**
 - b. lze provést pouze s odstupem minimálně 2 týdny
 - c. nedoporučuje se kombinovat obě očkování, ani s odstupem
- 9) Dvěma dávkami Pandemrixu s.c. se očkují
 - a. všichni očkovaní
 - b. **pacienti na dialýze**
 - c. **pacienti, u nichž ke kontraindikace podání i.m.,**

Studie HOPE stále nepřekonaná str 26

- 10) Pro regresi orgánových změn je potřebná dávka ramiprilu
 - a. 2,5 mg denně
 - b. 5 mg denně
 - c. **10 mg denně**