



RIZIKOVÉ FAKTORY PROGRESE COVID-19 DO ZÁVAŽNÉ FORMY A/NEBO HOSPITALIZACE

- * **Věk ≥ 65 let**
- * **Věk ≥ 55 let a současně alespoň jedno z těchto kritérií:**
 - léčený vysoký krevní tlak
 - obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m²
- * **Obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m²**
- * **Chronické onemocnění ledvin v pravidelném sledování lékařem** - včetně dialyzovaných osob
- * **Jaterní cirhóza**
- * **Diabetes mellitus (cukrovka) léčený tabletami či inzulínem**
- * **Středně těžká a těžká porucha imunity** (primární nebo sekundární imunodeficit), **léčba potlačující imunitu** (imunosupresivní léčba):
 - pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně
 - pacienti v léčbě pro onkologické nebo hematoonkologické onemocnění
 - pacienti na biologické léčbě či léčbě kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den prednisonu
- * **Chronické plicní onemocnění v pravidelném sledování lékařem** (chronická obstrukční plicní choroba na pravidelné léčbě, intersticiální plicní onemocnění, obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
- * **Trombofilní stav v pravidelném sledování lékařem** (zejména: primární trombofilie, rezistence aktivovaného proteinu C - Leidenská mutace faktoru V v homozygotní konstelaci, nedostatek antitrombinu, proteinu C nebo proteinu S, mutace protrombinového genu, antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom, přítomný lupus koagulans a opakovaná tromboembolická příhoda v minulosti)
- * **Neurologická onemocnění ovlivňující dýchání**
- * **Věk 12 – 17 let a současně alespoň jedno z uvedených kritérií:** obezita s BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové onemocnění - např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu - např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19)
- * Jiné individuální rizikové faktory progresu covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika

Zpracováno podle [Covid-19: diagnostika a léčba Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP \(verze 30/05/2022\)](#).

Doporučení se mohou v čase měnit, jsou platná k datu poslední revize. Poslední revize: 20.7.2022

Autoři:

MUDr. David Halata, MUDr. Ludmila Bezdíčková, MUDr. Michaela Kantorová, MUDr. Zuzana Švadlenková,
MUDr. Michaela Petrová, MUDr. Marika Svatošová, MUDr. Norbert Král, MUDr. Ondřej Sobotka, MUDr. Jáchym Bednář

Oponenti:

doc. MUDr. Bohumil Seifert, MUDr. Cyril Mucha

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Sokolská 31, 120 00 Praha 2, e-mail: svl@cls.cz, web: <http://www.svl.cz>, <https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/>

