

## ZNALOSTNÍ TEST 5 - 2006

### Hypertenzní krize, diagnostika a léčba v praxi

#### 1. Emergentní situace u hypertenzní krize znamená:

- a) **stav náhlého zvýšení TK s poškozením cílových orgánů a je indikací k okamžitému převezení pacienta na jednotku intenzivní péče**
- b) stav vysoké hypertenze bez poškození cílových orgánů, lze zvládnout ambulantně nebo při hospitalizaci na standardním lůžku
- c) akutní stav s náhlým zvýšením krevního tlaku bez rozlišení, zda-li je přítomno orgánové poškození nebo ne

### Vliv obstrukční spánkové apnoe na kardiovaskulární aparát

#### 2. OSA – obstrukční spánkové apnoe znamená:

- a) zhoršení nočního dýchání s apnoickými pauzami v důsledku hypoxie u pacientů s CHOPN
- b) **opakované epizody apnoe nebo hypopnoe způsobené obstrukcí na úrovni orofaryngu**
- c) noční apnoické pauzy u osob po CMP

### Hyperurikémie a metabolický syndrom

#### 3. Farmakologická léčba u asymptomatické hyperurikémie

- a) je vždy indikována
- b) **je sporná**
- c) není indikována

#### 4. Hydrochlorothiazid urikémií

- a) snižuje
- b) nemění
- c) **zvyšuje**

#### 5. ACEI inhibitory urikémií

- a) **snižují**
- b) nemění
- c) zvyšují

## Revaskularizace tepen při ischemické chorobě dolních končetin

6. Při rozhodování o dalším vyšetřování a intervenci je uznávána hranice klaudikační vzdálenosti

- a) 20 m
- b) 50 m
- c) 100 m**

7. Atrofie hýžd'ových svalů

- a. může být příznakem tzv. Lerichova syndromu při uzavření subrenálního úseku aorty**
- b. je hlavním diagnostickým příznakem koarktace aorty
- c. nemá nic společného s aterosklerotickými uzávěry tepen

8. Syndrom diabetické nohy postihuje asi

- a. 5% diabetiků
- b. 10% diabetiků
- c. 15% diabetiků**

9. Myalgie po statinech znamenají indikaci k přerušení léčby statiny. Po jejich vymizení postupujeme následovně

- a. nasadíme preparát jiné skupiny, další léčba statiny je kontraindikována
- b. lze opatrně nasadit malou dávku jiného statinu, až 40% pacientů se statiny indukovanou myalgií může pokračovat v léčbě jiným preparátem ze skupiny statinů**
- c. lze se opatrně vrátit ke stejnému preparátu a postupně titrovat dávku do maximální snášenlivosti, až 80% pacientů bude nakonec schopno tolerovat původně nasazenou dávku

## probiotika a prebiotika

10. Jako probiotika neužívají

- a. Escherichia coli
- b. Bifidobakterie
- c. Streptococcus agalactiae**