

ZNALOSTNÍ TEST 6 - 2006

V tomto testu je správná vždy jen jedna z odpovědí

Funkční poruchy trávicího traktu

1. pocit plnosti v epigastriu a brzká sytost jsou typickými příznaky pro následující typ funkční gastropatie:
 - a) dráždivý žaludek
 - b) chabý žaludek**
 - c) funkční próza
2. urychlení střevní pasáže, řídká, světlá a nápadně páchnoucí stolicí často smíšená s plynem jsou typické příznaky:
 - a) funkčního průjmu
 - b) kvasné enteropatie**
 - c) dráždivého tračníku
3. Mezi příznaky funkční poruchy trávicího traktu nepatří:
 - a) dysfágie**
 - b) říhání
 - c) zvracení

Atopická dermatitida v létě

4. Letní období zlepšuje atopický ekzém u asi
 - a) 25% atopiků
 - b) 50% atopiků
 - c) 75% atopiků**
5. Fotosenzitivní účinek nemají následující masti s deriváty dehtu
 - a) pix pasta
 - b) Holtova mast
 - c) ichtamolová mast**
6. při léčbě atopického ekzému lokálními kortikosteroidy dochází k
 - a) přechodné depigmentaci ošetřených ložisek**
 - b) přechodné hyperpigmentaci ošetřených ložisek
 - c) nemá vliv na pigmentaci

Diabetes mellitus v primární praxi

7. Počet diabetiků podle statistik v posledních 20 letech
- a) vzrostl o 30%
 - b) vzrostl o 50%
 - c) **se zdvojnásobil**
8. Mezi metody, kterými je možno diagnostikovat diabetes mellitus, nepatří
- a) **glykémie v 60. minutě oGTT $\geq 11,1$ mmol/l**
 - b) glykémie ve 120. minutě oGTT $\geq 11,1$ mmol/l
 - c) Přítomnost klasických příznaků cukrovky + náhodná glykémie $\geq 11,1$ mmol/l
9. Normální glukózovou toleranci definujeme jako:
- a) glykémii v 60. min. oGTT $< 7,8$ mmol/l při normální glykémii nalačno
 - b) **glykémii ve 120. min. oGTT $< 7,8$ mmol/l při normální glykémii nalačno**
 - c) glykémii ve 120. min. oGTT $< 7,8$ mmol/l při glykémii nalačno do 6,9 mmol/l

Bolest až na prvním místě

10. prevalence bolesti u bércového vředu je udávána jako
- a) **1/3 pacientů má bolest trvalou a 2/3 pacientů bolest občasnou**
 - b) 1/3 pacientů nemá bolesti, 1/3 pacientů má bolest trvalou a 1/3 pacientů bolest občasnou
 - c) 2/3 pacientů nemají bolesti, 1/3 pacientů má bolest trvalou nebo občasnou